

**Tour d'horizon des ressources biologiques disponibles
(Février 2026)**

Nom de l'étude	Population	Traitement	Point de prélèvement	Prélèvements sanguins : type d'échantillons	T° de stockage	Nombre total d'échantillons restant	Equivalent patients	Tubes	Analyses réalisées
GCO-001 NIPINEC	Neuroendocrine poumon et digestif	Nivolumab ± ipilimumab	- Inclusion - A 8 semaines - A progression	PBMC	-80°C	721	155	EDTA K2	
GCO-001 NIPINEC	Neuroendocrine poumon et digestif	Nivolumab ± ipilimumab	- Inclusion - A 8 semaines - A progression	Plasma	-80°C	414	155	EDTA K2	Phénotype lymphocytaire
GCO-001 NIPINEC	Neuroendocrine poumon et digestif	Nivolumab ± ipilimumab	- Inclusion - A 8 semaines - A progression	Serum	-80°C	286	155	sec CAT	Phénotype lymphocytaire
IFCT-0302 Surveillance	Stades I à IIIa opérés	Surveillance minimale vs surveillance scanographique	- A 8 semaines	ADN constitutionnel	-80°C	2794	962	EDTA	Faisabilité des miR Protéine CCSP plasmatique Polymorphisme CCSP
IFCT-0302 Surveillance	Stades I à IIIa opérés	Surveillance minimale vs surveillance scanographique	- A progression	Plasma	-80°C	5920	960	EDTA	Faisabilité des miR Protéine CCSP plasmatique Polymorphisme CCSP
IFCT-0702 Rechute	CBNPC en rechute après résection complète et chimiothérapie péri-opératoire	Docetaxel + cisplatine (6 cycles max) vs docetaxel (6 cycles max)	- A l'inclusion - Après 2 cycles - Après 4 cycles	Plasma	-80°C	164	62	EDTA	Aucune
IFCT-0702 Rechute	CBNPC en rechute après résection complète et chimiothérapie péri-opératoire	Docetaxel + cisplatine (6 cycles max) vs docetaxel (6 cycles max)	- A l'inclusion - Après 2 cycles - Après 4 cycles	PBMC	-80°C	325	65	CPT	Aucune
IFCT-0702 Rechute	CBNPC en rechute après résection complète et chimiothérapie péri-opératoire	Docetaxel + cisplatine (6 cycles max) vs docetaxel (6 cycles max)	- A l'inclusion - Après 2 cycles - Après 4 cycles	Sérum	-80°C	325	65	Secs (bouchon or)	Aucune
IFCT-0703 Pazopanib adjuvant	CBNPC stade I opéré (traitement adjuvant)	Pazopanib en situation adjuvante vs placebo (24 semaines)	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - A 12 semaines - A 24 semaines (fin du traitement)	Sérum	-80°C	627	133	Secs (bouchon or)	Minimal residual disease
IFCT-0802 Petites cellules	Petites cellules de stade étendu (1ère ligne)	PCDE ou PE 2 cycles puis randomisation PCDE ou PE (4 cycles max) ± bevacizumab jusqu'à progression	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - A la randomisation (chimio-naïfs)	Sérum	-80°C	215	128	Secs (bouchon or)	VEGF
IFCT-0803 Radiochimiothérapie	CBNPC stade III inopérable (1ère ligne)	Cisplatine + alimta + cetuximab (4 cycles) + radiothérapie	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - A la fin du traitement	Plasma	-20°C	161	89	EDTA	Aucune
IFCT-0803 Radiochimiothérapie	CBNPC stade III inopérable (1ère ligne)	Cisplatine + alimta + cetuximab (4 cycles) + radiothérapie	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - A la fin du traitement	Sérum	-20°C	170	90	Secs (bouchon or)	Aucune
IFCT-1001 CHIVA	CBNPC stade IV HIV positif (1ère ligne)	Carboplatine + pemetrexed (4 cycles) puis pemetrexed en maintenance	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - Après 2 cycles - Après 4 cycles	Plasma	-20°C	69	43	EDTA	ctDNA : TP53, KRAS, STK11, EGFR, NRAS, BRAF, MET, DDR2, HER2, FGFR1, FGFR3
IFCT-1001 CHIVA	CBNPC stade IV HIV positif (1ère ligne)	Carboplatine + pemetrexed (4 cycles) puis pemetrexed en maintenance	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - Après 2 cycles - Après 4 cycles	Sérum	-20°C	125	59	Secs (bouchon or)	ctDNA : TP53, KRAS, STK11, EGFR, NRAS, BRAF, MET, DDR2, HER2, FGFR1, FGFR3
IFCT-1002 BioCAST	CBNPC chez patients non fumeurs	Etude observationnelle	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Plasma	-80°C	2795	419	EDTA	ADN tumoral circulant dans le plasma (NGS)
IFCT-1002 BioCAST	CBNPC chez patients non fumeurs	Etude observationnelle	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Sérum	-80°C	1062	419	Secs (bouchon or)	ADN tumoral circulant dans le plasma (NGS)
IFCT-1002 BioCAST	CBNPC chez patients non fumeurs	Etude observationnelle	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	ADN constitutionnel	-80°C	1484	419	EDTA	ADN tumoral circulant dans le plasma (NGS)
IFCT-1002 BioCAST	CBNPC chez patients non fumeurs	Etude observationnelle	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Lymphocyte du sang périphérique (PBL)	-196°C	691	417	ACD (bouchon jaune)	ADN tumoral circulant dans le plasma (NGS)
IFCT-1003 LADIE	Femmes atteintes de CBNPC stade IV mutés EGFR et non mutés (1ère, 2ème ou 3ème ligne)	Gefinib ou erlotinib ± fulvestrant jusqu'à progression	- A l'inclusion - A 4 semaines - A 8 semaines	Plasma	-80°C	1626	333	EDTA	Etude des mécanismes épigénétiques/épitranscriptomiques impliqués dans la résistance aux ITK anti EGFR (Epimark)
IFCT-1003 LADIE	Femmes atteintes de CBNPC stade IV mutés EGFR et non mutés (1ère, 2ème ou 3ème ligne)	Gefinib ou erlotinib ± fulvestrant jusqu'à progression	- A l'inclusion - A 4 semaines - A 8 semaines	Sérum	-80°C	1664	334	Secs (bouchon or)	Aucune
IFCT-1003 LADIE	Femmes atteintes de CBNPC stade IV mutés EGFR et non mutés (1ère, 2ème ou 3ème ligne)	Gefinib ou erlotinib ± fulvestrant jusqu'à progression	- A l'inclusion - A chaque EVA	Plasma	-80°C	46	5	EDTA	T790M
IFCT-1003 LADIE	Femmes atteintes de CBNPC stade IV mutés EGFR et non mutés (1ère, 2ème ou 3ème ligne)	Gefinib ou erlotinib ± fulvestrant jusqu'à progression	- A l'inclusion - A chaque EVA	Plasma	-80°C	177	46	EDTA	T790M

Tour d'horizon des ressources biologiques disponibles
(Février 2026)

Nom de l'étude	Population	Traitement	Point de prélèvement	Prélèvements sanguins : type d'échantillons	T° de stockage	Nombre total d'échantillons restant	Equivalent patients	Tubes	Analyses réalisées
IFCT-1102 BUCIL	CBNPC stade IV (1ère ligne)	1ère séquence : Cisplatine + pemetrexed + bevacizumab (3 cycles) puis bevacizumab en maintenance. A progression 2ème séquence : cisplatine + pemetrexed + bevacizumab (3 cycles) puis bevacizumab + pemetrexed jusqu'à progression	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - Fin de la 1ère séquence - 1ère éval maintenance seq 1 - Prog 1 - Fin de la 2ème séquence - 1ère éval maintenance seq 2 - Prog 2	Plasma	-80°C	1289	109	EDTA	Aucune
IFCT-1401 BR.31	Stade IB à IIIA opéré	Durvalumab adjuvant	- Inclusion - Fin de traitement - Récidive	Plasma	-80°C	910	266	EDTA-K2	Minimal residual disease
IFCT-1401 BR.31	Stade IB à IIIA opéré	Durvalumab adjuvant	- Inclusion - Fin de traitement - Récidive	Sang total	-80°C	2779	346	EDTA-K2	Minimal residual disease
IFCT-1401 BR.31	Stade IB à IIIA opéré	Durvalumab adjuvant	- Inclusion - Fin de traitement - Récidive	Serum	-80°C	1798	348	Tubes secs	Aucune
IFCT-1501 MAPS2	Mésothéliome malin de la plèvre (2ème/3ème ligne)	Nivolumab ± ipilimumab	- A l'inclusion - A 12 semaines	Plasma	-80°C	556	118	EDTA	INIMeso : impact of Interleukin-6 in patients treated with Nivolumab with or without ipilimumab for malignant Mesothelioma (M. ROULLEAUX DUGAGE)
IFCT-1501 MAPS2	Mésothéliome malin de la plèvre (2ème/3ème ligne)	Nivolumab ± ipilimumab	- A l'inclusion - A 12 semaines	Serum	-80°C	735	118	Sec	Aucune
IFCT-1503 ACE	EGFR muté	afatinib ± cetuximab	- Inclusion - chaque évaluation - Progression	Plasma	-80°C	3315	116	Cell-Free DNA BCT	ctDNA
IFCT-1601 IONESCO	Stade IB à IIA	Durvalumab néoadjuvant	- Inclusion -3ème injection	PBMC	-196°C	237	48	EDTA K2	Aucune
IFCT-1602 CHIVA2	CBNPC stade IV HIV avancé (≥2ème ligne)	Nivolumab	- Inclusion - Cycle 2, 3, 9, 15, 27, 51 - Fin de traitement - En cas d'événement indésirable lié à l'immunité	PBMC (culots)	-80°C	69	10	EDTA	CD4 cell counts, plasma HIV-RNA, cell associated (CA) HIV-DNA, EBV, CMV, HBV, HCV, and HHV-8 viral loads, activation markers, ICP expression and virus-specific T cells, HLA typing
IFCT-1602 CHIVA2	CBNPC stade IV HIV avancé (≥2ème ligne)	Nivolumab	- Inclusion - Cycle 2, 3, 9, 15, 27, 51 - Fin de traitement - En cas d'événement indésirable lié à l'immunité	PBMC	-150°C	186	10	EDTA	
IFCT-1602 CHIVA2	CBNPC stade IV HIV avancé (≥2ème ligne)	Nivolumab	- Inclusion - Cycle 2, 3, 9, 15, 27, 51 - Fin de traitement - En cas d'événement indésirable lié à l'immunité	Plasma	-80°C	399	10	ACD (bouchon jaune)	
IFCT-1603 CPC	Petites cellules de stade étendu	Atezolizumab	- Inclusion - chaque évaluation - Progression	Plasma	-80°C	184	46	EDTA K2	NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, RB1, TP53, ADN circulant, VAF
IFCT-1603 CPC	Petites cellules de stade étendu	Atezolizumab	- Inclusion - chaque évaluation - Progression	Serum	-80°C	319	71	sec CAT	NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, RB1, TP53, ADN circulant, VAF
IFCT-1701 DICIPLE	Stade IV	Stop and go nivolumab + ipilimumab	- Inclusion - Randomisation	Plasma	-80°C	1114	230	EDTA K2	Aucune
IFCT-1701 DICIPLE	Stade IV	Stop and go nivolumab + ipilimumab	- Inclusion - Randomisation	ADN	-80°C	1710	233	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-1703 R2D2	CBNPC muté HER2	Trastuzumab + pertuzumab + docetaxel	- Inclusion -Tous les 3 mois - Progression	ADN	-80°C	858	44	Cell-Free DNA	Aucune Projet B. Besse
IFCT-1802 SAVIMMUNE	CBNPC Stade IV PS2-3	Durvalumab	- inclusion - 8 semaines - fin de traitement ou progression	Sérum	-80°C	476	45	Tube sec BD SSTI	Aucune
IFCT-1802 SAVIMMUNE	CBNPC Stade IV PS2-3	Durvalumab	- inclusion - 8 semaines - fin de traitement ou progression	ADN	-80°C	360	46	Cell-Free DNA	Aucune

Tour d'horizon des ressources biologiques disponibles
(Février 2026)

Nom de l'étude	Population	Traitement	Point de prélèvement	Prélèvements sanguins : type d'échantillons	T° de stockage	Nombre total d'échantillons restant	Equivalent patients	Tubes	Analyses réalisées
IFCT-1804 ORBITAL	CBNPC muté EGFR + métastases cérébrales ou leptoméningées	Osimertinib	- inclusion - 6 semaines - toutes les 6 semaines pendant 1 an puis toutes les 8 semaines	Plasma	-80°C	2536	51	EDTA	Aucune
IFCT-1804 ORBITAL	CBNPC muté EGFR + métastases cérébrales ou leptoméningées	Osimertinib	- inclusion - 6 semaines	Plasma	-80°C	161	49	Héparine lithium	Aucune
IFCT-1901 IND227	Mésothéliome malin de la plèvre (1ère ligne)	Pembrolizumab + chimio	Inclusion Fin C6 Fin pembrolizumab Progression	Plasma	-80°C	1128	89	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-1901 IND227	Mésothéliome malin de la plèvre (1ère ligne)	Pembrolizumab + chimio	Inclusion Fin C6 Fin pembrolizumab Progression	Sérum	-80°C	533	89	tube sec CAT	Aucune
IFCT-1901 IND227	Mésothéliome malin de la plèvre (1ère ligne)	Pembrolizumab + chimio	Inclusion Fin C6 Fin pembrolizumab Progression	Buffy Coat	-80°C	384	88	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-1902 ORAKLE	CBNPC de stade avancé ALK positif	Lorlatinib	- Inclusion, - J21, - J42, - Toutes les 6 semaines, - A progression.	ADN	-80°C	510	24	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-2003 ALBATROS	CBNPC de stade avancé ROS1 positif	Lorlatinib	- Inclusion, - Toutes les 8 semaines, - A progression.	ADN	-80°C	1341	52	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-GFPC-1101 Maintenance	CBNPC non-épidermoïde stade IV, statut EGFR sauvage ou inconnu (1ère ligne)	- Bras A : cisplatine + pemetrexed puis pemetrexed si réponse ou stabilité - Bras B expérimental : cisplatine + gemcitabine puis gemcitabine si réponse objective ou pemetrexed si stabilité	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Plasma	-80°C	2969	809	EDTA	Valeurs pronostique et prédictive de hPG80 dans le cancer bronchique non à petites cellules de stade IV et d'histologie non-épidermoïde en fonction de la réponse à la chimiothérapie d'induction. (Progastrin Manufacturing)
IFCT-GFPC-1101 Maintenance	CBNPC non-épidermoïde stade IV, statut EGFR sauvage ou inconnu (1ère ligne)	- Bras A : cisplatine + pemetrexed puis pemetrexed si réponse ou stabilité - Bras B expérimental : cisplatine + gemcitabine puis gemcitabine si réponse objective ou pemetrexed si stabilité	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Sérum	-80°C	1623	809	Sec	Aucune
IFCT-GFPC-1101 Maintenance	CBNPC non-épidermoïde stade IV, statut EGFR sauvage ou inconnu (1ère ligne)	- Bras A : cisplatine + pemetrexed puis pemetrexed si réponse ou stabilité - Bras B expérimental : cisplatine + gemcitabine puis gemcitabine si réponse objective ou pemetrexed si stabilité	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Culot de GR	-80°C	643	809	EDTA	Aucune