Tour d'horizon des ressources biologiques disponibles
(Novembre 2026)

Nom de l'étude	Population	Traitement	Point de prélèvement	Prélèvements sanguins : type d'échantillons	T° de stockage	Nombre total d'échantillons restant	Equivalent patients	Tubes	Analyses réalisées
GCO-001 NIPINEC	Neuroendocrine poumon et digestif	Nivolumab ± ipilimumab	- Inclusion - A 8 semaines - A progression	PBMC	-80°C	721	155	EDTA K2	
GCO-001 NIPINEC	Neuroendocrine poumon et digestif	Nivolumab ± ipilimumab	- Inclusion - A 8 semaines - A progression	Plasma	-80°C	414	155	EDTA K2	Phénotype lymphocytaire
GCO-001 NIPINEC	Neuroendocrine poumon et digestif	Nivolumab ± ipilimumab	- Inclusion - A 8 semaines - A progression	Sérum	-80°C	286	155	Sec CAT	Phénotype lymphocytaire
IFCT-0302 Surveillance	Stades I à IIIa opérés	Surveillance minimale *vs* surveillance scanographique	- A 8 semaines	ADN	-80°C	2794	961	EDTA	Faisabilité des miR Protéine CCSP plasmatique Polymorphisme CCSP
IFCT-0302 Surveillance	Stades I à IIIa opérés	Surveillance minimale *vs* surveillance scanographique	- A progression	Plasma	-80°C	5920	958	EDTA	Faisabilité des miR Protéine CCSP plasmatique Polymorphisme CCSP
IFCT-0702 Rechute	CBNPC en rechute après résection complète et chimiothérapie péri-opératoire	Docetaxel + cisplatine (6 cycles max) *vs* docetaxel (6 cycles max)	- A l'inclusion - Après 2 cycles - Après 4 cycles	PBMC	-80°C	325	65	CPT	Aucune
IFCT-0702 Rechute	CBNPC en rechute après résection complète et chimiothérapie péri-opératoire	Docetaxel + cisplatine (6 cycles max) *vs* docetaxel (6 cycles max)	- A l'inclusion - Après 2 cycles - Après 4 cycles	Plasma	-80°C	164	62	EDTA K3	Aucune
IFCT-0702 Rechute	CBNPC en rechute après résection complète et chimiothérapie péri-opératoire	Docetaxel + cisplatine (6 cycles max) *vs* docetaxel (6 cycles max)	- A l'inclusion - Après 2 cycles - Après 4 cycles	Sérum	-80°C	325	65	Sec SST	Aucune
IFCT-0703 Pazopanib adjuvant	CBNPC stade I opéré (traitement adjuvant)	Pazopanib en situation adjuvante *vs* placebo (24 semaines)	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - A 12 semaines - A 24 semaines (fin du traitement)	Sérum	-80°C	627	133	Sec SST	Minimal residual disease
IFCT-0802 Petites cellules	Petites cellules de stade étendu (1ère ligne)	PCDE ou PE 2 cycles puis randomisation PCDE ou PE (4 cycles max) ± bevacizumab jusqu'à progression	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - A la randomisation (chimio-naïfs)	Sérum	-80°C	215	128	Sec SST	VEGF
IFCT-0803 Radiochimiothérapie	CBNPC stade III inopérable (1ère ligne)	Cisplatine + alimta + cetuximab (4 cycles) + radiothérapie	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - A la fin du traitement	Plasma	-20°C	161	89	EDTA K3	Aucune
IFCT-0803 Radiochimiothérapie	CBNPC stade III inopérable (1ère ligne)	Cisplatine + alimta + cetuximab (4 cycles) + radiothérapie	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - A la fin du traitement	Sérum	-20°C	170	90	Sec SST	Aucune
IFCT-1001 CHIVA	CBNPC stade IV HIV positif (1ère ligne)	Carboplatine + pemetrexed (4 cycles) puis pemetrexed en maintenance	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - Après 2 cycles - Après 4 cycles	Plasma	-20°C	69	43	EDTA K3	ctDNA : TP53, KRAS, STK11, EGFR, NRAS, BRAF, MET, DDR2, HER2, FGFR1, FGFR3
IFCT-1001 CHIVA	CBNPC stade IV HIV positif (1ère ligne)	Carboplatine + pemetrexed (4 cycles) puis pemetrexed en maintenance	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - Après 2 cycles - Après 4 cycles	Sérum	-20°C	125	59	Sec SST	ctDNA : TP53, KRAS, STK11, EGFR, NRAS, BRAF, MET, DDR2, HER2, FGFR1, FGFR3
IFCT-1002 BioCAST	CBNPC chez patients non fumeurs	Etude observationnelle	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Plasma	-80°C	2795	418	EDTA	ADN tumoral circulant dans le plasma (NGS)
IFCT-1002 BioCAST	CBNPC chez patients non fumeurs	Etude observationnelle	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Lymphocyte du sang périphérique (PBL)	-196°C	691	417	ACD	ADN tumoral circulant dans le plasma (NGS)
IFCT-1002 BioCAST	CBNPC chez patients non fumeurs	Etude observationnelle	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	ADN	-80°C	1484	418	EDTA	ADN tumoral circulant dans le plasma (NGS)
IFCT-1002 BioCAST	CBNPC chez patients non fumeurs	Etude observationnelle	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Sérum	-80°C	1061	418	Sec SST	ADN tumoral circulant dans le plasma (NGS)
IFCT-1003 LADIE	Femmes atteintes de CBNPC stade IV mutés EGFR et non mutés (1ère, 2ème ou 3ème ligne)	Gefinib ou erlotinib ± fulvestrant jusqu'à progression	- A l'inclusion - A 4 semaines - A 8 semaines	Plasma	-80°C	1626	333	EDTA K3	Etude des mécanismes épigénétiques/épitranscriptomiques impliqués dans la résistance aux ITK anti EGFR (Epimark)
IFCT-1003 LADIE	Femmes atteintes de CBNPC stade IV mutés EGFR et non mutés (1ère, 2ème ou 3ème ligne)	Gefinib ou erlotinib ± fulvestrant jusqu'à progression	- A l'inclusion - A 4 semaines - A 8 semaines	Sérum	-80°C	1664	334	Sec SST	Aucune
IFCT-1003 LADIE (T790M)	Femmes atteintes de CBNPC stade IV mutés EGFR et non mutés (1ère, 2ème ou 3ème ligne)	Gefinib ou erlotinib ± fulvestrant jusqu'à progression	- A l'inclusion - A chaque EVA - Progression	Plasma	-80°C	46	5	EDTA	T790M
IFCT-1003 LADIE (T790M)	Femmes atteintes de CBNPC stade IV mutés EGFR et non mutés (1ère, 2ème ou 3ème ligne)	Gefinib ou erlotinib ± fulvestrant jusqu'à progression	- A l'inclusion - A chaque EVA - Progression	Plasma	-80°C	177	46	EDTA	T790M
IFCT-1102 BUCIL	CBNPC stade IV (1ère ligne)	1ère séquence : Cisplatine + pemetrexed + bevacizumab (3 cycles) puis bevacizumab en maintenance. A progression 2ème séquence : cisplatine + pemetrexed + bevacizumab (3 cycles) puis bevacizumab + pemetrexed jusqu'à progression	- A l'inclusion (chimio-naïfs) - Fin de la 1ère séquence - 1ère éval maintenance séq 1 - Prog 1 - Fin de la 2ème séquence - 1ère éval maintenance séq 2 - Prog 2	Plasma	-80°C	1289	109	EDTA	Aucune

Tour d'horizon des ressources biologiques disponibles
(Novembre 2026)

Nom de l'étude	Population	Traitement	Point de prélèvement	Prélèvements sanguins : type d'échantillons	T° de stockage	Nombre total d'échantillons restant	Equivalent patients	Tubes	Analyses réalisées
IFCT-1401 BR.31	Stade IB à IIIA opéré	Durvalumab adjuvant	- Inclusion - Fin de traitement - Récidive	Sérum	-80°C	1798	348	Sec CAT	Aucune
IFCT-1401 BR.31	Stade IB à IIIA opéré	Durvalumab adjuvant	- Inclusion - Fin de traitement - Récidive	Plasma	-80°C	910	266	EDTA K2	Minimal residual disease
IFCT-1401 BR.31	Stade IB à IIIA opéré	Durvalumab adjuvant	- Inclusion - Fin de traitement - Récidive	Sang total	-80°C	2779	346	EDTA K2	Minimal residual disease
IFCT-1501 MAPS2	Mésothéliome malin de la plèvre ($2^{ème}$/ $3^{ème}$ ligne)	Nivolumab ± ipilimumab	- A l'inclusion - A 12 semaines	Sérum	-80°C	735	118	Sec	Aucune
IFCT-1501 MAPS2	Mésothéliome malin de la plèvre ($2^{ème}$/ $3^{ème}$ ligne)	Nivolumab ± ipilimumab	- A l'inclusion - A 12 semaines	Plasma	-80°C	556	118	EDTA	INIMeso : impact of Interleukin-6 in patients treated with Nivolumab with or without Ipilimumab for malignant Mesothelioma (M. ROULLEAUX DUGAGE)
IFCT-1503 ACE	EGFR muté	afatinib ± cetuximab	- Inclusion - chaque évaluation - Progression	Plasma	-80°C	3315	116	Cell-Free DNA	ctDNA
IFCT-1601 IONESCO	Stade IB à IIA	Durvalumab néoadjuvant	- Inclusion -3ème injection	Plasma	-80°C	178	48	EDTA K2	**Analyses prévues/en cours** : test "tumor-informed" simplifié reposant sur un panel NGS ciblant 54 gènes fréquemment altérés dans les CPNPC, test "tumor-agnostic" fondé sur l'analyse de la méthylation de l'ADNtc, panel exploratoire de protéines plasmatiques.
IFCT-1601 IONESCO	Stade IB à IIA	Durvalumab néoadjuvant	- Inclusion -3ème injection	PBMC	-196°C	237	48	EDTA K2	Aucune
IFCT-1602 CHIVA2	CBNPC stade IV HIV avancé (≥2ème ligne)	Nivolumab	- Inclusion - Cycle 2, 3, 9, 15, 27, 51 - Fin de traitement - En cas d'événement indésirable lié à l'immunité	PBMC (culots)	-80°C	69	10	EDTA K2	CD4 cell counts, plasma HIV-RNA, cell associated (CA) HIV-DNA, EBV, CMV, HBV, HCV, and HHV-8 viral loads, activation markers, ICP expression and virus-specific T cells, HLA typing
IFCT-1602 CHIVA2	CBNPC stade IV HIV avancé (≥2ème ligne)	Nivolumab	- Inclusion - Cycle 2, 3, 9, 15, 27, 51 - Fin de traitement - En cas d'événement indésirable lié à l'immunité	Plasma	-80°C	399	10	ACD	CD4 cell counts, plasma HIV-RNA, cell associated (CA) HIV-DNA, EBV, CMV, HBV, HCV, and HHV-8 viral loads, activation markers, ICP expression and virus-specific T cells, HLA typing
IFCT-1602 CHIVA2	CBNPC stade IV HIV avancé (≥2ème ligne)	Nivolumab	- Inclusion - Cycle 2, 3, 9, 15, 27, 51 - Fin de traitement - En cas d'événement indésirable lié à l'immunité	PBMC	-150°C	186	10	EDTA K2	CD4 cell counts, plasma HIV-RNA, cell associated (CA) HIV-DNA, EBV, CMV, HBV, HCV, and HHV-8 viral loads, activation markers, ICP expression and virus-specific T cells, HLA typing
IFCT-1603 CPC	Petites cellules de stade étendu	Atezolizumab	- Inclusion - chaque évaluation - Progression	Sérum	-80°C	319	71	Sec CAT	Aucune
IFCT-1603 CPC	Petites cellules de stade étendu	Atezolizumab	- Inclusion - chaque évaluation - Progression	Plasma	-80°C	184	46	EDTA K2	NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, RB1, TP53, ADN circulant, VAF
IFCT-1701 DICIPLE	Stade IV	Stop and go nivolumab + ipilimumab	- Inclusion - Randomisation	ADN	-80°C	1710	233	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-1701 DICIPLE	Stade IV	Stop and go nivolumab + ipilimumab	- Inclusion - Randomisation	Plasma	-80°C	1114	230	EDTA K2	Aucune
IFCT-1703 R2D2	CBNPC muté HER2	Trastuzumab + pertuzumab + docetaxel	- Inclusion -Tous les 3 mois - Progression	ADN	-80°C	858	44	Cell-Free DNA	Aucune Projet B. Besse
IFCT-1802 SAVIMMUNE	CBNPC Stade IV PS2-3	Durvalumab	- inclusion - 8 semaines - fin de traitement ou progression	Sérum	-80°C	476	45	Sec SST	Aucune
IFCT-1802 SAVIMMUNE	CBNPC Stade IV PS2-3	Durvalumab	- inclusion - 8 semaines - fin de traitement ou progression	ADN	-80°C	360	46	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-1804 ORBITAL	CBNPC muté EGFR + métastases cérébrales ou leptoméningées	Osimertinib	- inclusion - 6 semaines	Plasma	-80°C	161	49	Héparine lithium	Aucune
IFCT-1804 ORBITAL	CBNPC muté EGFR + métastases cérébrales ou leptoméningées	Osimertinib	- inclusion - 6 semaines - toutes les 6 semaines pendant 1 an puis toutes les 8 semaines	Plasma	-80°C	2536	51	EDTA	Aucune
IFCT-1805 ELDERLY	CBNPC de stade avancé chez les patients agés	4 cycles cisplatine-paclitaxel ± atezolizumab	inclusion	ADN	-80°C	1341	312	Cell-Free DNA	**Analyses prévues/en cours :** Next Generation Sequencing (NGS), Gene expression profiling performed by RNASeq analysis.
IFCT-1805 ELDERLY	CBNPC de stade avancé chez les patients agés	4 cycles cisplatine-paclitaxel ± atezolizumab	inclusion	Buffy Coat	-80°C	615	309	EDTA K2	**Analyses prévues/en cours :** whole genome association study (GWAS) of variants associated with response to treatment in the elderly population

Tour d'horizon des ressources biologiques disponibles
(Novembre 2026)

Nom de l'étude	Population	Traitement	Point de prélèvement	Prélèvements sanguins : type d'échantillons	T° de stockage	Nombre total d'échantillons restant	Equivalent patients	Tubes	Analyses réalisées
IFCT-1805 ELDERLY	CBNPC de stade avancé chez les patients agés	4 cycles cisplatine-paclitaxel ± atezolizumab	inclusion	Plasma	-80°C	1625	309	EDTA K2	**Analyses prévues/en cours :** LIPI score (Lung Immune Prognostic Index), cytokines and chemokines level, multiplex bead immunofluorescent cytometric assay
IFCT-1901 IND227	Mésothéliome malin de la plèvre (1ère ligne)	Pembrolizumab + chimio	Inclusion Fin C6 Fin pembrolizumab Progression	Sérum	-80°C	533	89	Sec CAT	Aucune
IFCT-1901 IND227	Mésothéliome malin de la plèvre (1ère ligne)	Pembrolizumab + chimio	Inclusion Fin C6 Fin pembrolizumab Progression	Plasma	-80°C	1128	89	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-1901 IND227	Mésothéliome malin de la plèvre (1ère ligne)	Pembrolizumab + chimio	Inclusion Fin C6 Fin pembrolizumab Progression	Buffy Coat	-80°C	384	88	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-1902 ORAKLE	CBNPC de stade avancé ALK positif	Lorlatinib	- Inclusion, - J21, - J42, - Toutes les 6 semaines, - A progression.	ADN	-80°C	510	24	Cell-Free DNA	Aucune
IFCT-GFPC-1101 Maintenance	CBNPC non-épidermoïde stade IV, statut EGFR sauvage ou inconnu (1ère ligne)	- Bras A : cisplatine + pemetrexed puis pemetrexed si réponse ou stabilité - Bras B expérimental : cisplatine + gemcitabine puis gemcitabine si réponse objective ou pemetrexed si stabilité	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Sérum	-80°C	1623	809	Sec	Aucune
IFCT-GFPC-1101 Maintenance	CBNPC non-épidermoïde stade IV, statut EGFR sauvage ou inconnu (1ère ligne)	- Bras A : cisplatine + pemetrexed puis pemetrexed si réponse ou stabilité - Bras B expérimental : cisplatine + gemcitabine puis gemcitabine si réponse objective ou pemetrexed si stabilité	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Plasma	-80°C	2969	809	EDTA	Valeurs pronostique et prédictive de hPG80 dans le cancer bronchique non à petites cellules de stade IV et d'histologie non-épidermoïde en fonction de la réponse à la chimiothérapie d'induction. (Progastrin Manufacturing)
IFCT-GFPC-1101 Maintenance	CBNPC non-épidermoïde stade IV, statut EGFR sauvage ou inconnu (1ère ligne)	- Bras A : cisplatine + pemetrexed puis pemetrexed si réponse ou stabilité - Bras B expérimental : cisplatine + gemcitabine puis gemcitabine si réponse objective ou pemetrexed si stabilité	- A l'inclusion (chimio-naïfs)	Culot de GR	-80°C	643	809	EDTA	Aucune